


Ріст та розвиток



Менструальний вік (тижні)	Приблизна тім'яково-куприкова довжина (см)	Зовнішні ознаки
24	21	<i>Шкіра зморщена та червона</i>
26	23	<i>Вже є нігті на руках. Тулуб ще малий</i>
28	25	<i>Очі частково відкриті. Вже є вії</i>
30	27	<i>Очі відкриті. Вже є волосяний покрив. Шкіра дещо зморщена</i>
32	28	<i>З'являються нігті на пальцях ніг. Тіло набирає ваги. Опускаються яєчка</i>
34	30	<i>Нігті на пальцях рук досягають кінчиків пальців. Шкіра рожева та гладенька</i>
38	34	<i>Тіло вже набрало ваги. Первісний волосяний покрив (пушок) майже відсутній. Нігті на пальцях ніг вже досягають кінчиків пальців. Рухливі кінцівки; сильний хапальний рефлекс</i>
40	36	<i>Випинаюча грудна клітка; виділяються груди. Яєчка знаходяться в мошонці або їх можна прощупати в пахових каналах. Нігті пальців рук вже виступають над кінчиками пальців</i>

Відносні розміри плода у терміні 26-40 тижнів (згідно дати останньої менструації) та морфологічні характеристики, що допомагають встановити вік плоду. Дані взяті з книги Moore (The Developing Human, ed. 4, W.B.Saunders Co., 1988).