




# Вимірювання передпліччя

3, 50 та 97 перцентилі довжини передпліччя відповідно до гестаційного віку. Довжина передпліччя визначається відстанню між ліктьовим та шиловидним відростком променевої кістки, зігнутої під кутом 90 градусів руки. Дані обстеження 87 доношених (48 хлопчиків та 39 дівчаток) та 111 недоношених (55 хлопчиків та 56 дівчаток) ізраїльських новонароджених 27-41 тижнів гестації у перші 36-60 годин життя. Жодна дитина не мала вроджених вад. Merlob P et al: Birth Defects: Orig Art Series XX(7):37, 1984.



3, 50 та 97 перцентилі довжини передпліччя відповідно до гестаційного віку. Довжина передпліччя визначається відстанню між ліктьовим та шиловидним відростком променевої кістки, зігнутої під кутом 90 градусів руки. Дані обстеження 87 доношених (48 хлопчиків та 39 дівчаток) та 111 недоношених (55 хлопчиків та 56 дівчаток) ізраїльських новонароджених 27-41 тижнів гестації у перші 36-60 годин життя. Жодна дитина не мала вроджених вад. Merlob P et al: Birth Defects: Orig Art Series XX(7):37, 1984.



3, 50 та 97 перцентилі індексу довжини передпліччя відповідно до гестаційного віку.

$$\text{Індекс довжини передпліччя} = \frac{\text{Довжина передпліччя}}{\text{Довжина верхньої кінцівки}}$$

Див. пояснення вище. Merlob P et al: Birth Defects: Orig Art Series XX(7):37, 1984.